

D Gebrauchsinformation

Eimerol • Pflegemittel für Reptilien gegen Coccidien (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- und *Isospora*-Arten).

Gebrauchsinformation: Vor Gebrauch schütteln! Gegen Coccidien (*Eimeria*-, *Sarcocystis* - und *Isospora* -Arten) sind pro 10 g Körpergewicht 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** einmalig oral zu verabreichen. Die Behandlung ist nach einer Woche zu wiederholen. Geben Sie dazu mit der beiliegenden Spritze die entsprechende Menge **Eimerol** in die Mundhöhle des Tieres. Schlangen können das Pflegemittel auch über Futtertiere verabreicht bekommen. Dazu reiben Sie dem Futtertier

(Nagetier) die benötigte Menge **Eimerol** kurz vor der Verfütterung in das Fell.

Zusammensetzung je 100 ml: Diclazuril 0,4 g.

Unter Verschluss und für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen. Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt aufbewahren. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden! Nicht mit Arzneimitteln anwenden.

US Information for use

Eimerol • Treatment for reptiles against Coccidia (*Eimeria*, *Sarcocystis* and *Isospora* species).

Directions for use: Shake well before using! Apply 0.05 ml (= 50 µl) **Eimerol** per each 10 g (0.35 oz.) body weight once orally against Coccidia (*Eimeria*, *Sarcocystis* and *Isospora* species). The treatment must be repeated after a week. Insert the corresponding amount of **Eimerol** into the oral cavity of the animal with the included syringe to do so. The treatment can also be applied via food animals for snakes.

Rub the required amount of **Eimerol** into the fur of the food animal (rodent) immediately before feeding to do so.

Composition per 100 ml: diclazuril 0.4 g.

Keep under lock and key and out of reach of children and pets! Avoid contact with skin and eyes. Store at room temperature and away from light! Not to be used in conjunction with animals used for human consumption. Do not use past the expiration of the "best before" date! Do not combine with medications.

F Information mode d'emploi

Eimerol • Traitement pour les reptiles contre les coccidies (espèces *Eimeria*, *Sarcocystis* et *Isospora*).

Mode d'emploi : Agitez avant emploi ! Pour lutter contre les coccidies (espèces *Eimeria*, *Sarcocystis* et *Isospora*), administrer par voie orale une fois 0,05 ml (= 50 µl) d'**Eimerol** pour 10 g de poids. Renouveler le traitement après une semaine. Versez la quantité correspondante d'**Eimerol** dans la cavité buccale de l'animal à l'aide de la seringue fournie. Le traitement peut également être administré aux serpents par le biais des proies servant de nourriture. Pour cela, frottez le poil de la proie (rongeur) avec la quantité nécessaire d'**Eimerol** peu avant de la donner à votre reptile.

Composition dans 100 ml : diclazuril 0,4 g.

Conserver bien fermé et tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à température ambiante et à l'abri de la lumière. Ne pas utiliser sur des animaux destinés à la consommation ! Ne plus utiliser après la date limite d'utilisation.

Ne pas combiner avec d'autres produits de traitement de l'eau.

**Distributeur : SERA France SAS, 25A rue de Turckheim
F 68000 Colmar • Tél. +49 2452 9126-0 • Fabriqué en Allemagne**

NL Gebruikersinformatie

Eimerol • Verzorgingsmiddel voor reptielen tegen coccidiën (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- en *Isospora*-soorten).

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik schudden! Tegen coccidiën (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- en *Isospora*-soorten) moet per 10 g lichaamsgewicht 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** eenmalig oraal worden toegediend. De behandeling moet na een week weer worden herhaald. Doe daartoe met de bijgevoegde spuit de passende hoeveelheid **Eimerol** in de mondholte van het dier. Aan slangen kan het verzorgingsmiddel ook via voederdieren worden verstrekt. Wrijf daartoe kort voor het voederen

de huid van het voerdier (knaagdier) met de benodigde hoeveelheid **Eimerol** in.

Samenstelling in 100 ml: diclazuril 0,4 g.

Afgesloten en ontoegankelijk voor kinderen en huisdieren bewaren. Niet in contact met huid en ogen brengen. Bewaren bij kamertemperatuur en beschermd tegen licht. Niet gebruiken bij dieren, die voor consumptie bestemd zijn. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken! Niet in combinatie met andere verzorgingsmiddelen gebruiken.

I Informazioni per l'uso

Eimerol • Prodotto per la cura dei rettili contro Coccidi (specie *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*).

Istruzioni per l'uso: Agitare prima dell'uso! Per eliminare Coccidi (specie *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*) somministrare per via orale 0,05 ml (= 50 µl) di **Eimerol** per ogni 10 g di peso corporeo. Il trattamento va ripetuto dopo una settimana. La quantità appropriata di **Eimerol** va somministrata nella cavità orale dell'animale utilizzando la siringa inclusa nella confezione. Ai serpenti il prodotto può essere somministrato anche aggiungendolo sul loro cibo. In questo caso strofinare la quantità necessaria di **Eimerol** sul pelo dell'animale

(roditore) poco prima della somministrazione.

Composizione per 100 ml: Diclazuril 0,4 g.

Conservare in un armadietto chiuso e lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare il contatto con pelle e occhi. Conservare a temperatura ambiente e al buio. Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Dopo la scadenza non deve essere più utilizzato!

Non può essere usato in combinazione a prodotti curativi.

**Importato da: SERA Italia s.r.l., Via Gamberini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)**

E Información para el usuario

Eimerol • Producto de cuidado para reptiles contra coccidios (especies *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*).

Instrucciones de uso: ¡Agítese antes de usar! Contra coccidios (especies *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*) se deben administrar una sola vez por vía oral 0,05 ml (= 50 µl) de **Eimerol** por cada 10 g de peso corporal. El tratamiento se debe repetir al cabo de una semana. Para ello, administre con la jeringa incluida la cantidad correspondiente de **Eimerol** en la cavidad bucal del animal. A las serpientes también se les puede administrar el producto de cuidado a través de animales ali-

menticios. Para ello, unte en la piel del animal alimenticio (roedor) la cantidad necesaria de **Eimerol** poco antes de darlo de comer.

Composición en 100 ml: diclazuril, 0,4 g.

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños y animales de compañía. Evite el contacto con la piel y los ojos. Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. No usar en animales destinados a la alimentación. ¡No usar después de la fecha de caducidad!

No combine este producto con medicamentos.

P Instruções para utilização

Eimerol • Tratamento para répteis contra Coccídeos (espécies de *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*).

Instruções para utilização: Agite bem antes de usar! Contra Coccídeos (espécies de *Eimeria*, *Sarcocystis* e *Isospora*) administrar, uma só vez e por via oral, 0,05 ml (= 50 µl) de **Eimerol** por cada 10 gramas de peso do animal. O tratamento deve-se repetir após uma semana. Para isso, utilizando a seringa incluída na embalagem, introduza a quantidade correspondente de **Eimerol** na boca do animal. As cobras também podem receber o tratamento através dos animais que elas comem. Para isso, pouco antes da alimentação, aplique a quantidade

necessária de **Eimerol** sobre o alimento vivo (roedor) esfregando no pêlo.

Composição para 100 ml: Diclazuril, 0,4 g.

Mantenha fechado à chave e fora do alcance das crianças e animais de estimação. Não deve entrar em contacto com a pele e com os olhos. Guardar à temperatura ambiente e longe da luz. Não deve ser usado em animais destinados a consumo humano. Por favor não usar após a data "Consumir de preferência antes de"! Não combinar com medicamentos.

S Produktinformation

Eimerol • Preparat till reptiler mot coccidia (*Eimeria*, *Sarcocystis* i *Isospora* species).

Bruksanvisning: Omskakas före användning! Ge en gång 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** per 10 g kroppsvikt oralt mot coccidia (*Eimeria*, *Sarcocystis* i *Isospora* species). Behandlingen måste upprepas efter en vecka. Ge motsvarande mängd **Eimerol** i djurets mun med hjälp av den bifogade sprutan. Ormar kan få medlet även via foderdjur. Gnid

den nödvändiga mängden **Eimerol** i foderdjurets (gnagarens) päls strax före utfodringen.

Sammansättning per 100 ml: diclazuril 0,4 g.

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Undvik kontakt med huden och ögonen. Förvaras vid rumstemperatur och skyddat för ljus. Efter bäst-före datumet bör preparatet ej längre användas! Får ej användas samtidigt med preparat mot sjukdomar.

FI Käyttöohje

Eimerol • Matelijoiden hoitoaine Kokkidiisia vastaan (*Eimeria*, *Sarcocystis* ja *Isospora* lajit).

Käyttöohjeet: Ravista hyvin ennen käyttöä! Annostelee 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerolia** jokaista 10 g ruumiinpainoa kohden kerran suuonteloon Kokkidiisia (*Eimeria*, *Sarcocystis* ja *Isospora* lajit). Hoito on uusittava viikon kuluttua. Aseta annosteltava määrä **Eimerolia** eläimen suuonteloon mukana olevalla lääkeruiskulla. Hoitoainetta voidaan myös annostella käärmeiden ruokaeläimiin. Hiero annosteltava määrä **Eimerolia**

ruokaeläimen turkkiin (jyrsijä) välittömästi ennen ruokintaa.

Koostumus per 100 ml: diclazuril 0,4 g.

Säilytettävä lukitussa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Vältä ihon ja silmien joutumista kosketukseen aineen kanssa. Säilytettävä huoneenlämmössä ja valolta suojattuna. Ei saa käyttää elintarvikkeiksi tarkoitetuille eläimille! Älä käytä tuotetta "parasta ennen" päiväyksen jälkeen! Älä käytä yhdessä hoitoaineen kanssa.

DK Brugsinformation

Eimerol • Plejemiddel til reptiler mod coccidier (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- og *Isospora*-arter).

Bruksanvisning: Omrystes før brug! Mod coccidier (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- og *Isospora*-arter) skal der pr. 10 g kropsvægt gives 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** én gang oralt. Behandlingen skal gentages efter en uge. Hertil sprøjtes den pågældende mængde **Eimerol** ind i dyrets mundhule med den medfølgende sprøjte. Slinger kan plejemidlet også gives via foderdyr. Hertil gnides den nødvendige mængde **Eimerol** ind

i foderdyrets (gnaver) pels kort før fodringen.

Sammensætning pr. 100 ml: Diclazuril 0,4 g.

Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Undgå kontakt med hud og øjne. Opbevares mørkt og ved stuetemperatur. Må ikke anvendes til dyr, der bruges i fødevarer. Efter udløb af holdbarhedsdatoen må det ikke anvendes mere! Må ikke anvendes sammen med medikamenter.

GR Γενικές Πληροφορίες

Eimerol • **Θεραπεία για ερπετά, κατά των κοκκιδίων (Είδη *Eimeria*, *Sarcocystis* και *Isospora*).**

Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Χορηγήστε μια δόση από το στόμα 0.05ml (= 50µl) **Eimerol** για κάθε 10g σωματικού βάρους κατά των κοκκιδίων (είδη *Eimeria*, *Sarcocystis* και *Isospora*). Η θεραπεία θα πρέπει να επαναληφθεί μετά από μια εβδομάδα. Χορηγήστε την απαιτούμενη ποσότητα του **Eimerol** μέσα στην στοματική κοιλότητα του ζώου χρησιμοποιώντας την σύριγγα που περιέχεται στην συσκευασία. Η θεραπεία μπορεί επίσης να χορηγηθεί στα φίδια και μέσω των προς βρώσιν ζωντανών. Βρέξτε την γούνα του ζώου (πρωκτικού) με την

SI Navodilo za uporabo

Eimerol • **Sredstvo za nego plazilcev proti zajedavcem Coccidia (vrste *Eimeria*-, *Sarcocystis*- in *Isospora*).**

Uporaba: Pred uporabo pretesti! Proti zajedavcem Coccidia (vrste *Eimeria*-, *Sarcocystis*- in *Isospora*) dajte živali enkrat oralno na 10 g telesne teže 0,05 ml (= 50 µl) sredstva **Eimerol**. Postopek po enem tednu ponovite. Pri tem dajte ustrezno količino sredstva za nego **Eimerol** s priloženo brizgalko v ustno votlino plazila. Pri kačah lahko daste sredstvo na živo hrano. Žival za hrano (glodavec) tik pred hranjenjem kače namažite po dlaki s primerno količino sredstva **Eimerol**.

H Felhasználási információ

Eimerol • **Ápólószer hüllők számára coccidiák ellen (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- és *Isospora*-félék).**

Használati információ: Használat előtt felrázandó! Coccidiák (*Eimeria*-, *Sarcocystis*- és *Isospora*-félék) ellen az állat testének minden 10 grammja után 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol**-t egyszeri alkalommal orálisan adjon be az állatnak. A kezelést egy hét elteltével ismételje meg. A mellékelt fecskendővel adja a **Eimerol**-t az állat szájüregébe. A kigyóknak az ápolószert az eledelállatokon keresztül is be lehet adni. Ilyen esetben a szükséges mennyiségű **Eimerol**-t kenje az eledelállat

PL Informacje o zastosowaniu

Eimerol • **Terapia dla gadów w przypadku pierwotniaków kokcydia (*Eimeria*, *Sarcocystis* i *Isospora*).**

Instrukcja stosowania: Wstrząsnać przed użyciem! W przypadku pierwotniaków kokcydia (*Eimeria*, *Sarcocystis* i *Isospora*), stosować doustnie podając jednorazowo 0,05 ml (= 50 µl) preparatu **Eimerol** na każde 10 g masy ciała. Kurację należy powtórzyć po tygodniu. Odpowiednią ilość preparatu **Eimerol** podawać do jamy ustnej zwierzęcia przy pomocy załączonej strzykawki. Zabieg może być także stosowany przy użyciu zwierząt, które są pokarmem np. dla węży. Wymagana

CZ Informační popis

Eimerol • **Přípravek pro reptilie proti Kokcidií (druhy *Eimeria*, *Sarcocystis* a *Isospora*).**

Návod k použití: Před použitím zatřepat! Proti Kokcidií (střevní prvoci) (druh *Eimeria*, *Sarcocystis* a *Isospora*) aplikujte orálně jednorázové 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** na 10 g tělesné váhy. Ošetření je třeba provést po týdnu znovu. Použijte k tomu přiloženou stříkačku a dejte patřičné množství přípravku **Eimerol** do ústní dutiny zvířete. Hadi mohou přípravek dostat i v krmnéo zvířeti. Většete příslušné množství

TR Kullanım bilgileri

Eimerol • **Koksidiyale karşı sürünge­lenlerin tedavi edilmesi (*Eimeria*, *Sarkosistis* ve *Izospora* türleri).**

Kullanma talimatı: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız! Koksidiyale karşı vücut ağırlığında her 10 g için 0,05 ml (= 50 µl) **Eimerol** tedavisini ağızdan bir kez uygulayınız (*Eimeria*, Sarkosistis ve Izospora türleri). Bir hafta sonra tekrarlanmalıdır. Uygun miktarda **Eimerol**’ü hayvanın ağız boşluğuna şırınga ile uygulayınız. Tedavi yılanlar için yem hayvanlar vasıtasıyla da uygulanabilir. Gerekli miktarda **Eimerol**’ü ovarak yem

RUS Инструкция по применению

Эймерол (Eimerol) • Средство по уходу для рептилий против кокцидий (родов *Eimeria*, *Sarcocystis* и *Isospora*).

Указания по применению: Перед применением взболтать! Против кокцидий (родов *Eimeria*, *Sarcocystis* и *Isospora*) давать 0,05 мл (= 50 мкл) **Эймерола** на каждые 10 г веса животного орально один раз. Повторить процедуру через неделю. Чтобы сделать это – вставьте прилагаемый шприц с соответствующим количеством **Эймерола** в ротовую полость животного и введите средство. Для змей можно также давать средство с живым кормом. Для этого вотрите необходимое количество **Эймерола** в шерсть животного

C 艾美樂爾

艾美樂爾 • **爬行動物護理劑，用於對抗雙孢子球蟲（艾美球蟲屬、肉孢子蟲屬和等孢球蟲屬）。**

使用說明：使用前請充分的搖晃均勻！對抗雙孢子球蟲（艾美球蟲屬、肉孢子蟲屬和等孢球蟲屬），每10克體重0.05毫升（= 50微升）**艾美樂爾**，一次性口服。一周後重複治療。用隨附注射器將相應劑量的**艾美樂爾**給入動物口腔內。在治療蛇時，也可通過飼料動物而給入護理劑。此時，在即將喂蛇之前，將相應劑量的**艾美樂爾**摩擦

J 使用説明書

アイメロール • 爬虫類の球虫類 (*Eimeria*, *Sarcocystis* と *Isospora* 種) に対するお手入れ用薬剤

【使用方法】使用前に容器をよく振ってください！ 球虫類 (*Eimeria*, *Sarcocystis*, *Isospora* 種) に対しては体重 10 g あたりにつき、0.05 ml (= 50 µl) の **アイメロール** を一回、経口投与してください。このお手入れを一週間後に繰り返してください。この場合には添付の注射器で、適切な量の **アイメロール** をペットの口腔内に入れてください。蛇についてはこの薬剤は餌用動物によっても投与することができます。

ROK 사용설명서

아이메롤 • **파충류를 포자충 (*Eimeria*, *Sarcocystis* 및 *Isospora* 종)으로부터 보호해주는 약제.**

사용안내서: 사용전 흔들어 주세요! 포자충 (*Eimeria*, *Sarcocystis* 및 *Isospora* 종) 제거를 위해 체중 10 g당 0.05 ml (= 50 µl)의 **아이메롤**을 1회 구강투여한다. 1주 후 처리를 반복해준다. 이때 적당한 주사기를 사용, 해당량의 **아이메롤**을 동물의 구강에 넣어준다. 뱀에게 약제를 투여할 때는 사료용 동물을 통해서도 가능하다. 즉, 사료용 동

을 την απαιτούμενη ποσότητα από το **Eimerol** αμέσως πριν το τάισμα. **Σύνθεση ανά 100ml:** Diclazuril 0.4g.

Αποθηκεύστε το σε κλειδωμένο βουλάττι μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Φυλάξτε το σκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την απευθείας έκθεση του σε ηλιακό φως. Μην το χρησιμοποιείτε για ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης! Μην συνδυάζετε την θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα.

Sestava v 100 ml: diclazuril 0,4 g.

Hranite dobro zaprto in izven dosega otrok in domačih živali. Pripravek ne sme priti v stik s kožo ali z očmi. Shranite pri sobni temperaturi in zaščitite pred svetlobo. Ne uporabljati pri živalih, ki so namenjene za prehrano. Po preteku roka trajanja ne uporabljajte več!

Ne uporabljajte hkrati z zdravilnimi sredstvi.

Zastopnik za SI: Vitakraft Hobby Program d.o.o., 2311 Hoče Slovenija

(rágcsáló) bundájába röviddel etetés előtt.

Összetétel 100 ml-ben: diklazuril 0,4 g.

Lezárva és gyerekektől és háziállatoktól elzárva tárolni. Ne érintkezzen a bőrrel ill. Szobahőmérsékleten és fénytől védett helyen tárolni. Ne használja élelmezési célokra tartott állatoknál. A lejárát dátuma után ne használja!

Gyógyszerrel együtt ne használja.

Forgalmazó: sera Akvarisztika Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75.

ilość preparatu **Eimerol** wetrzeć w futro zwierząt stosowanych jako pokarm (gryzoni) bezpośrednio przed skarmieniem.

Skład w 100 ml: diclazuril 0,4 g.

Trzymać w zamknięciu pod kluczem z dala od dzieci i zwierząt. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od światła. Nie może być stosowany dla zwierząt przeznaczone­ych do konsumpcji dla ludzi. Nie może być używany po upływie daty ważności!

Nie łączyć z lekars­twa­mi. Wyłącznie dla zwierząt!

Eimerol do srsti krmného zvieräte (hlodavce) krátkce před krmením.

Složení na 100 ml: Diclazuril 0,4 g.

Skladovat pod zámek a chránit před dětmi a domácími zvířaty. Přípravek se nesmí dostat do kontaktu s kůží ani s očima. Skladovat v temnu při pokojové teplotě. Nepoužívejte u zvířat určených ke konzumaci. Nepoužívat po uplynutí lhůty trvanlivosti! Nepoužívat v kombinaci s léčiv­y.

Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

hayvanın kürküne (rodent) hemen beslenme öncesinde sürünüz.

Bileşimi/100 ml: diclazuril 0,4 g.

Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde ve kilitleli olarak saklayın. Gözlerle ve ciltle temasından kaçının. Oda sıcaklığında ve karanlıkta muhafaza ediniz. Besin maddesi yapımında kullanılan hayvanlar için kullanılmaz. Son kullanma tarihinden sonra kullanılmaz!
ilaçlarla birlikte kullanmayın.

(грызуна), предназначенного в пищу, незадолго до кормления.

Состав на 100 мл: диклазурил - 0,4 г.

Хранить закрытым, в недоступном для детей и домашних животных месте. Избегайте контакта с кожей и глазами. Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света месте. Не применять для воды в случае ее возможного использования животными, предназначенными для употребления человеком в пищу. Не использовать после истечения срока годности!
Недопустимо применение вместе с лекарственными средствами.

到飼料動物（齧齒動物）的皮毛內。

每100毫升所含成分：地克珠利0.4克。

請放置在上鎖的且幼童和寵物觸不到的地點。請避免與皮膚和眼睛接觸。請存放在室溫環境下並且避開光照。請勿將此產品用於人類食用的動物身上。請勿在使用期限過後繼續使用本產品！請勿和藥物混合使用。

この場合には餌用動物（齧齒類）に必要な量の**アイメロール**を餌付する少し前に毛皮に擦りつけてください。

100 mlあたりの成分: ディクラズリル 0.4 g。

お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。皮膚に触れたり、目に入らないようご注意ください。直射日光の当たらない室温で保管してください。食用動物には使用しないでください。治療薬と併用しないでください。

물 (설치류)을 먹이로 주기 직전 해당량의 **아이메롤**을 표피에 문질러 준다.

100 ml 당 구성성분: 디클라주릴 0.4 g

쉽게 열지 못하게 하고 어린이와 동물의 접근이 어려운 안전한 곳에 보관하십시오. 피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오. 실내용도에 서 어두운 장소에 보관하십시오!
식료품 생산 관련 동물에는 사용하지 마십시오. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오!
의약품과 함께 사용하지 마십시오.

SA تعليمات الإستعمال

ايميرول (Eimerol) • مادة عناية للزواحف ضد الكوكسيديا (أنواع اميريا، الكبيسات اللحمية ساركوسيستيس وايسوسپورا).

تعليمات الإستعمال: يجب رجه­ا قبل الإستعمال! ضد الكوكسيديا (أنواع اميريا، الكبيسات اللحمية ساركوسيستيس وايسوسپورا) يجب إعطاء ٠.٠٥ مليلتر (= ٥٠ ميكرو­لتر) من ايميرول عبر الفم مرة واحدة وهذا عن كل ١٠ غرام من وزن الجسم. يجب تكرار العلاج بعد أسبوع واحد. قم لهذا الغرض بإعطاء الكمية المناسبة من ايميرول في فم الحيوان بواسطة الحقنة المرفقة. يمكن تقديم مادة العناية للأفاعي أيضا عبر الحيوانات العلفية. قم لهذا الغرض قبل تقديم